

GRANDES CULTURES

SRPV NORD PAS-DE-CALAIS

Bulletin N° 25 du 22 novembre 1995

Céréales

Stade : levée à plein tallage

On observe, ça et là, quelques parcelles présentant une phytotoxicité due aux désherbants. Il s'agit souvent de parcelles ayant été désherbées juste avant les dernières gelées. Si vous prévoyez un désherbage, évitez d'intervenir avant une période de froid.

Pucerons vecteurs de la jaunisse

Comparaison du vol R. padi sur deux décades en 93, 94 et 95

	1993	1994	1995	
lère décade de novembre	55	21	9	
2ème décade de novembre	0	30	3	

Situation actuelle

Le vol des pucerons n'a pas repris depuis le dernier avertissement.

Céréales

⇒Pucerons: intervention sur les semis du 10 au 20/10/95

Le nombre de R. padi capturés pour la 2 ème décade de novembre ne dépasse pas 3 alors qu'il était de 30 à la même époque, l'an dernier. Dans les parcelles, les populations ont

légèrement augmenté. Les pucerons en place se sont multipliés malgré les conditions difficiles de ces derniers jours (voir tableau ci-dessous)

Observations du 21 novembre 1995

Secteur	Culture	Lieu	Date de semis	Variété	Stade	% de pieds porteurs
Bertincourt	Blé	Bus	27/09	Brigadier	2 talles	1 % (0)
		Bertincourt	16/10	Rialto	2-3 feuilles	1 % (0)
Loos- Arras	Escourgeon	Loos	05/10	Thalassa	plein tallage	16 % (0)
	Blé	Loos	05/10	Vivant	3 talles	14 % (+ 4 %)
		Farbus	13/10	Brigadier	3 feuillesà	9% (+6%)
					1 talle	
Montreuil	Escourgeon	Campigneulles				
		les grandes	28/09	Tamaris	3-4 talles	25 % (+ 3 %)
		Ecuires	06/10	Glenan	2 talles	20 % (+ 7 %)
	Blć	Ecuires	13/10	Genesis	1 talle	3 % (+ 2 %)
		Beaumerie	20/10	Trémie	2 feuilles	3 %, (+ 3 %)
Flandres	Escourgeon	Loon Plage	01/10	Systel	2-3 talles	1 % (0)
	Blé	Loon Plage	08/10	Ritmo	1-2 talles	1 % (0)
		Brouckerque	16/10		I talle	1 % (0)
		Drincham	16/10	-	3 feuilles	1 % (0)

() Variation par rapport à l'observation du 08/11/95





Préconisations

Les parcelles ayant reçu un insecticide début novembre ne sont pas recolonisées vu la faible intensité du vol. Une ré-intervention n'est pas justifiée.

Si vous êtes intervenu en octobre, vérifiez que vos parcelles n'abritent pas à nouveau des pucerons. Les semis compris entre le 10 et le 20 octobre doivent recevoir un insecticide, si ce n'est pas déjà fait. Les seuils d'intervention sont rarement atteints, mais il est impératif de ne pas laisser séjourner les pucerons trop longtemps en parcelle. Intervenez aux moments les plus chauds de la journée pour obtenir une

bonne efficacité des produits (températures minimum 8 à 10°C). Pour les semis postérieurs au 20 octobre, il est encore trop tôt pour intervenir.

Pas d'insecticide sur les céréales traitées GAUCHO.